Standard de la race ovine Soay

Remarque préliminaire : Parmi les moutons Soay vivant actuellement sur l'archipel de St Kilda, on y trouve des moutons avec et sans cornes, des toisons foncées et claires, quelques toisons unicolores noires ou beiges, avec plus ou moins de jarres (longs poils). La diversité doit être maintenue. Quant au phénotype, il a été décrit par les professeurs T.H. Clutton-Brock et J.M. Pemberton dans leur dernier ouvrage « Soay Sheep ».

Tête

- Assez fine, sans laine, marquage clair autour des yeux et descendant vers le museau, dessous du menton blanc
- Oreilles petites et fines, horizontales, de couleur claire à l'intérieur
- Présence ou non de cornes
- Les cornes du mâle sont assez massives formant un seul cercle (360°) en s'écartant de la tête ; la base des cornes forme idéalement entre elles un angle de 80-90°.
  Les cornes de la femelle sont petites, 20-25 cm de long, recourbées vers l'arrière et vers l'extérieur formant à leur base un angle de 70-80°.
- Mufle et nez assez fins, noirs
- Yeux de cervidés, peu saillants

Corps

- Aspect général assez ramassé, allure noble et ressemblant au mouflon
- Le rapport longueur / hauteur au garrot varie de 0,95 à 1,05 afin d'obtenir un animal relativement cubique.
- Poids moyen des béliers à 18 mois d'environ 36 à 38 kg
- Queue courte (+/- 12 cm), effilée, de couleur brun foncé.

Membres

- Les onglons sont fins, noirs

Toison - Robe

- Mue complète annuelle (un des principaux critères spécifiques de la race)
- La toison est formée de laine courte, fine et drue mêlée à des jarres (poils). Certaines toisons ont des jarres blancs sur les flancs (selle) comme chez le mouflon. Le type « poilu » est reconnaissable à sa crinière de jarres noirs plus ou moins développée, qui peut s'étendre jusqu'au-delà des épaules ; la brebis du type poilu a une petite crinière brune sur la nuque.
- Laine : la longueur des mèches est d'environ 5 cm et celles des jarres de 6 à 7 cm, mais ces derniers peuvent être beaucoup plus longs pour la crinière des mâles.
- Couleur : Toison généralement marron foncé à brun clair (caramel), avec le ventre clair (presque blanc) et le miroir de l'arrière-train clair (presque blanc). Il existe des spécimens tout noir ou tout beige clair, sans marquages clairs. *

*****

Défauts à éviter

- Taches blanches dans la toison
- Nez trop busqué
- Yeux à orbites saillantes
- Membres trop massifs
- Onglons trop larges
- Aplombs cagneux ou panards

Défauts éliminatoires

- Prognathisme (grignard)
- Brachygnathisme (bégu)
- Testicule absent (1 ou les 2) chez le mâle
- Cornes s'incurvant vers l'intérieur ou trop rapprochées (angle de moins de 60° à leur base)
- Laine : Mue incomplète ou à moins de de 95% **

- Agnelage nécessitant une assistance
- Faible résistance aux maladies

* Les taches blanches apparaissant sur quelques Soay pourraient être un caractère récessif d'un mouton 'scottish blackface' n'ayant pas été éliminé lors de l'évacuation de tous les animaux en 1932.

** Attention, car une brebis non saillie peut ne pas muer partiellement ou complètement ; un mouton supplémenté trop richement en hiver peut ne pas muer partiellement ou complètement.