



# Vendéen

Le mouton Vendéen peut s'élever en bergerie comme en plein air. Il fait preuve de rusticité par son adaptation à un climat alliant la rigueur des étés à celle de périodes très humides. La valeur laitière des brebis donne une croissance rapide des agneaux. Les agnelages sont faciles.

La race rassemble les deux types d'aptitudes souvent recherchés pour un même géniteur : d'une part, les aptitudes femelles (prolificité, valeur laitière, instinct maternel) et d'autre part, la valeur bouchère (potentiel de croissance, conformation).

## ORIGINE

Le mouton Vendéen est issu de la race du Poitou qui peu à peu s'est éteinte par croisements répétés avec la race Flandrine, importée au XVII<sup>e</sup> siècle par les Hollandais lors de travaux d'assèchement du marais Poitevin. Cette dernière, bonne laitière, de haute stature, améliore les qualités du Mouton Poitevin (animal vigoureux et à bon potentiel de transformation). Par la suite à la fin du 19<sup>e</sup> siècle, d'autres croisements sont réalisés avec entre autres du Mérinos qui va donner plus de finesse à la laine et du Southdown qui va apporter le développement musculaire.

## CONDUITE D'ÉLEVAGE

Les agnelles sont mises à la lutte dès la première année. La prolificité des brebis approche les 200 %. La valeur laitière des mères permet un excellent taux de croissance des agneaux et donc un temps de finition court pour atteindre des carcasses d'un poids idéal.

La période d'agnelage pour le mode d'élevage en plein air, se situe entre décembre et février. Les agneaux peuvent se finir à l'herbe, en fonction de la richesse des pâtures. Cette période peut être avancée, suivant un schéma plus précoce : les agneaux naissent alors en novembre ou décembre et se finissent en bergerie pour une consommation idéale à la fin de l'hiver.

Les brebis Vendéenne dessaisonnent plus ou moins facilement naturellement

### Précocité des chaleurs

Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier

Prolificité	Croissance	Qualité Bouchère	Qualité laitière	Rusticité alimentaire		
++	++	++	++	+++		

Sur une échelle de 3 +





## ADAPTABILITÉ

Le mouton Vendéen a retiré de ses régions d'origine une bonne adaptation aux écarts de températures ainsi qu'aux alternances entre sécheresse et périodes très humides. La race convient aux systèmes d'élevage de plein air, de semi plein air ou encore de bergerie pour l'élevage intensif. Il est capable d'évoluer tant sur des terrains pauvres que riches. Les agneaux peuvent naître à différentes périodes de l'année tant la race est plus ou moins facilement désaisonnable naturellement.

## STANDARD DE RACE (HORS DÉFAUT)

- Tête de couleur gris souris
- Front large et plat, chanfrein allongé et rectiligne
- Bord du nez large
- Encolure large à la base, sans fanon
- Présence d'un carré de laine sur la tête
- Poitrine ample et profonde
- Garrot épais avec des épaules soudées et musclées
- Dos, reins et bassin larges, longs et musclés
- Gigots épais, rebondis et descendus
- Pattes fortes et droites
- Bons aplombs, de la même couleur que la tête
- Laine blanche, sans tache et sans jarre



*Le Vénéen, une race avec une adaptabilité sans faille !*



Avec le soutien de la  
 **Wallonie**

**ELEVÉO** asbl

Service ovin-caprin

4, rue des Champs Elysées

B-5590 CINEY

**Tél.:** +32 83 23 06 34

**Fax.:** +32 83 23 06 76

**E-mail.:** [ovin.caprin@awegroupe.be](mailto:ovin.caprin@awegroupe.be)

**Site :** [www.aweoc.be](http://www.aweoc.be)